

BROCHURE

KAAKRECONSTRUCTIE BOTOPBOUW / SINUSLIFT

MKA HASSELT

info@mkahasselt.be

KAAKRECONSTRUCTIE (BOTOPBOUW / SINUSLIFT)

Wat is een botopbouw?

Een botopbouw is het verhogen of verbreden van de kaakwal door middel van een bottransplantaat. Deze ingreep wordt meestal uitgevoerd met het doel om implantaten te kunnen plaatsen.

Indien er een kleine hoeveelheid bot nodig is, kan het benodigde bot ergens uit de mondholte (vb. uit de kin regio of thv. de wijsheidstanden) worden getransplanteerd of kan men gebruik maken van kunstbot.

Deze ingreep kan, in samenspraak met de arts, zowel onder plaatselijke verdoving als onder narcose worden uitgevoerd.

Wanneer er een grotere hoeveelheid bot nodig is, wordt het bot getransplanteerd vanuit de bekkenkam of het schedeldak. Deze ingreep wordt onder volledige narcose uitgevoerd. Na deze ingreep moet je 1 of 2 nachten in het ziekenhuis verblijven.

Ongeveer vier tot vijf maanden na de botopbouw worden de implantaten geplaatst.

Wat is een sinuslift?

In de bovenkaak wordt vaak een sinuslift uitgevoerd. Als men op de plaats waar vroeger de kiezen stonden wil implanteren, ziet men vaak een sterk uitgezakte neusbijholte in de bovenkaak. De botdikte op die plaats is vaak te gering. Het doel van de behandeling is om de holle ruimte met bot op te vullen.

Tijdens deze behandeling wordt vanuit de mond een botluikje gemaakt in de bovenkaak. Dit botluikje wordt samen met het neusbijholteslijmvlies omhoog geschoven. De neusbijholte wordt daardoor iets kleiner.


Deze ingreep heeft geen consequenties. In de ontstane ruimte wordt er kunstbot aangebracht. De implantaten kunnen geplaatst worden na 3-6 maanden na de ingreep.

Nazorg

Bij een kleine reconstructie is de nalast minimaal. Een aantal dagen een zwelling van de wang en tijdelijk wat beperkte mondopening is zeer normaal.

U mag de eerste 24 uur na de ingreep koelen met ijs. Een 4 à 5 tal koelende sessies van 20 minuten is voldoende.

Voor uitgebreidere reconstructies waarbij bot uit het schedeldak of de bekkenkam wordt gebruikt, kan u wat meer last ervaren. Bij het afnemen van bot uit de bekkenkam is het normaal dat de spieren stijf zijn en het moeilijk is om trappen te lopen gedurende 1 week.



Na de ingreep krijgt u uitleg over de te verwachten nalast en wat u al dan niet mag doen. De dokter schrijft wanneer nodig medicatie digitaal voor op de identiteitskaart. Deze moet ingenomen worden na de ingreep.

Een goede wondgenezing is zeer belangrijk. Bij een slechte wondgenezing kan een ontsteking ontstaan, wat kan leiden tot (gedeeltelijk) verlies van de botopbouw. Een goede mondhygiëne is hierbij van groot belang.

Roken vertraagt de genezing van de wonde. Daarom raden wij de eerste 5 dagen een rookstop aan.

U krijgt een afspraak ongeveer 10 dagen na de ingreep ter controle van de wondheling.