



BROCHURE

OOGKASFRACTUUR

MKA HASSELT

info@mkahasselt.be

OOGKASFRACTUUR

Een oogkasfractuur of orbitafractuur is een breuk in de botten rond de oogkas. Dit kan leiden tot verschillende symptomen, zoals zwelling, blauwe plekken, dubbel zien en veranderingen in de stand van het oog.

Oorzaak

Een orbitafractuur kan worden veroorzaakt door een trauma aan het gezicht, zoals een val, een ongeluk of een sportblessure.

Behandeling

De behandeling van een orbitafractuur hangt af van de ernst van de breuk en de symptomen die het veroorzaakt. Bij lichte fracturen kan de behandeling bestaan uit rust, ijs, pijnstillers en het vermijden van activiteiten die de fractuur verergeren.

Bij ernstige fracturen kan een operatie noodzakelijk zijn om de breuk te herstellen en de oogkas te stabiliseren. Dit kan bijvoorbeeld een operatie zijn om een beschadigde oogspier te herstellen of om botfragmenten terug op hun plaats te zetten.

Het herstel van een orbitafractuur kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. Het is belangrijk om de instructies van de behandelend arts op te volgen en de nodige rust te nemen om het genezingsproces te bevorderen.

